

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

Edition A ou B : 150 F.

Edition A + B : 285 F.

ÉDITION GÉNÉRALE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

- 1 -

BULLETIN N° 25 du 17 septembre 1986

POMME DE TERRE	: Mildiou : traiter avant la fin de semaine
COLZA	: Surveiller les altises
	Limaces : visiter régulièrement vos parcelles
	Tableau désherbage en post levée

CE MESSAGE EST CONSULTABLE SUR MINITEL DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE.

MILDIOU

Situation :

De nouvelles contaminations ont été enregistrées ces derniers jours (selon les secteurs : les 6 - 8 - 11 - 12 et 13 septembre). Les premières sorties de taches théoriques sont prévues les 12 - 13 septembre les deuxièmes taches les 17 et 18 septembre.

Les traitements à base de fongicides de contact qui ont pu être réalisés ont été lessivés le 12 septembre.

Préconisation :

Intervenir avec de préférence un fongicide pénétrant dès réception de l'avis.

Penser à renouveler le traitement si plus de 25 mm de pluie cumulés



Pour profiter des informations par
MINITEL, appeler directement le
n° 36.15. et faire le code
EDIMK

COLZA

Altises :

Aucune capture n'a encore été signalée à ce jour. Les morsures sont observées sur 8 à 20 % des pieds selon les secteurs.

Relevez régulièrement vos pièges jaunes.

N'intervenez que si le seuil de 1 pied sur 3 présente des morsures en absence de microgranulés au semis.

Les pluies de ces derniers jours vont permettre une bonne efficacité des microgranulés épandus au semis. Le traitement contre les altises ne se justifie pas.

Le vol ne débutera que lors du retour d'un temps ensoleillé.

Limaces :

Avec le retour d'un temps doux et humide, surveillez attentivement vos parcelles.

Désherbage :

Nous reproduisons au verso un tableau des principaux herbicides utilisables en post levée présentant une action essentiellement graminicide.

P. 172

Matière active	Spécialité Commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg 5 à 6 kg contre chiendent de novembre à fin janvier	<ul style="list-style-type: none"> Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones.
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg 2 kg contre avoine à chapelet 3 kg contre chiendent	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. Bonne action sur graminées Action limitante sur Sanves, Ravenelles.
carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	3,5 kg - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées (dont repousses de céréales) Une action sur dicotylédones : Efficace sur : Véroniques, Mourons, Céraistes, coquelicot Irrégulier sur : Matricaires, gaillets
alloxydime-sodium	FERVIN + Huile	1 kg + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) 1,0 à 1,25 kg + 3 l. huile contre graminées vivaces.
fluazifop-butyl	FUSILADE + AGRAL	1,25 l. + 0,1 % vol. bouil. 3,0 l. +	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active. Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.
sethoxydime	FERVINAL	2 l. + 3 l. huile 3,0 l. + 3,0 l. huile Schéring	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) 3,0 l. + 3,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,7 l. + 0,1 % vol. bouil. 1,5 l. +	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.
haloxyfop-éthyl	GALLANT	1,0 l. 2,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Uniquement à l'automne Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées 2,0 l. contre graminées vivaces et Paturin
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l. + 2,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) 3,0 l. + 2,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces.